



இலங்கையின் உயர்தர கணித விஞ்ஞான
பிரிவிற் கான இணையதளம்

SCIENCE EAGLE

www.scienceeagle.com

- ✓ Biology
- ✓ C.Maths
- ✓ Physics
- ✓ Chemistry
- + more

 t.me/ScienceEagle
 [YouTube/ScienceEagle](https://www.youtube.com/ScienceEagle)
   [/ScienceEagleSL](https://www.instagram.com/ScienceEagleSL)





FWC

வடமாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்துடன் கிணைந்து
தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலையம் நடபாத்தும்
ஆறாம் தவணைப் பரீட்சை - 2020

Conducted by Field Work Centre, Thondaimanaru.
In Collaboration with Provincial Department of Education
Northern Province
Sixth Term Examination - 2020

கிராமவியல் - I
Chemistry - I

Two Hours

Gr. 13 (2020)

02

T

I

பகுதி - I

01. கீழ்த்தரப்பட்ட இரு கூற்றுக்களையும் கருதுக.

(I) நேரேற்றமுள்ள கருவினுள் சக்திமட்டங்களிலுள்ள மறையேற்றமுள்ள இலத்திரன்கள் கழன்று
சென்று (spiral) ஒட்டிக்கொள்வதில்லை.

(II) ஓர் அணுவில் காணப்படும் எந்த இரண்டு இலத்திரன்களுக்கும் நான்கு
சக்திச்சொட்டென்களும் ஒரே பெறுமானமாக அமைய முடியாது.

மேற்படி கூற்றுக்களுடன் தொடர்புள்ள விஞ்ஞானிகள் முறையே,

- 1) இரதபோட், பெளலி 2) நீல்போர், பெளலிங் 3) மேஸ்லி, டிபுரொக்லி
4) நீல்போர், பெளலி 5) தொம்சன், இரதபோட்


02. C, Mg, B, Si, S ஆகிய மூலகங்களின் உருகுநிலை பற்றிய தொடர்புகளில் சரியானது எது?

- 1) $C < Mg < Si < S < B$ 2) $S < Mg < B < Si < C$ 3) $S < Mg < Si < B < C$
4) $S < Si < Mg < B < C$ 5) $S < B < Mg < Si < C$

03. கூட்டம் 13 மூலகங்கள் பற்றிய கூற்றுக்களில் பொய்யானது எது?

- 1) கூட்டத்தில் கீழ் நோக்கிச் செல்கையில் உலோக இயல்பு அதிகரிக்கின்றது. ✓
2) Al ஈரியல்புடைய உலோகம் என்பதால் அது செறிந்த HNO_3 உடன் உடனடியாகத் தாக்கம்
புரிந்து H_2 வாயுவைத் தரும்.
3) இக்கூட்ட மூலகங்களின் சில ஒட்சைட்டுக்கள் ஈரியல்பைக்கொண்டிருக்கும். ✓
4) இக்கூட்டத்தில் அதிகமிய, அதிகுறைந்த உருகு நிலைகளைக் கொண்ட மூலகங்கள்
முறையே B, Ga ஆகும்.
5) Al^{3+} அயனின் நீர்க்கரைசலிற்கு $Na_2CO_3(aq)$ ஐச் சேர்க்கும் போது வாயு
வெளியேற்றத்துடன் ஊன்பசை போன்ற வீழ்படிவும் அவதானிக்கப்படும்.

04. பின்வரும் சேர்வையின் IUPAC பெயர் யாது?



- 1) 4 - amino - 1 - ethoxy - 5 - oxohex - 1 - one
2) ethyl - 4 - amino - 5 - oxohex - 2 - ynoate
3) ethyl 4 - amine - 5 - formyl - 2 - hexynoate
4) ethyl 4 - amino - 5 - oxohex - 2 - ynoate
5) ethoxy 4 - amino - 5 - oxohex - 2 - ynoate

06. ClF_4^- இல் Cl வண்ணைவச்சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடிக்கேத்திரகணிதம்.

- 1) முக்கோண இரு கூம்பகம்
4) நான்முகி

- 2) சதுரக்கூம்பகம்
5) எண்முகி

3) நிறுத்தாடுவளை (சீசோ)

06. பின்வரும் நீர்க்கரைசல்களைக் கருதுக.

(A) $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NH}_4\text{Cl}$

(B) $0.1 \text{ mol dm}^{-3} (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

(C) $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ CH}_3\text{COONa}$

(D) $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ HCOONa}$

மேலுள்ள A தொடக்கம் D வரையான கரைசல்களின் pH அதிகரிக்கும் வரிசை

1) $A < B < D < C$


2) $D < A < C < B$

3) $A < B < C < D$


4) $B < A < D < C$

5) $B < A < C < D$


07. சேதனச் சேர்வை X ஆனது பிரேடியின் சோதனைப்பொருளுடன் செம்மஞ்சள் வீழ்படிவைக் கொடுப்பதுடன் தொலனின் சோதனைப்பொருளைத் தாழ்த்துகின்றது. பின்வருவனவற்றுள் X ஆக இருக்கக் கூடியவை




(A)



(B)



(C)



(D)

1) A மட்டும்

2) A, C மட்டும்

3) C, D மட்டும்

4) A, B, C மட்டும்

5) A, B, C, D யாவும்

08. 3d தொடர் மூலகங்கள் பற்றிய சரியான கூற்று எது?

1) இவற்றின் முதலாம் அயனாக்கற்சக்திகள் அதே ஆவர்த்தனத்திலுள்ள S தொகுப்பு மூலகங்களை விடக்குறைவாகும்.

2) இவற்றின் மின்னெதிர்த்தன்மைப்பெறுமானங்கள் 4s மூலகங்களை விட உயர்வானவை.

3) உலோகப் பிணைப்பிற்கு இலத்திரன்களை விடுவிக்கும் ஆற்றல் குறைவாகக் கொண்டிருப்பதனால் 3d மூலகங்களில் Mn அதி தாழ்ந்த உருகு நிலையைக் கொண்டிருக்கும்.

4) 3d மூலகங்களில் முதல் அயனாக்கற்சக்தி மிகக் குறைந்தது Zn ஆகும்.

5) 3d மூலகங்களின் அணு ஆரைகள் Sc இலிருந்து Zn வரை தொடர்ச்சியாக குறையும்.

09. மென்னமிலம் HA ஐ ($K_a = 4 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$) வன்மூலம் ஒன்றுடன் கலந்து தாங்கற்கரைசலொன்றை தயாரிக்கமுடியும். $\text{pH} = 6$ ஆகவுள்ள தாங்கற் கரைசலைத் தயாரிப்பதற்கு மென்னமிலம் HA ஐயும் அதே செறிவுள்ள $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ ஐயும் முறையே என்ன கனவளவு விகிதத்தில் கலக்க வேண்டும்?

1) 1:1

2) 1:2

3) 7:2

4) 5:1


5) 3:2

10 கிரைமற் மின்வாய்களையி் பயன்படுத்தி $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ இன் 125 cm^3 இனூள் 5A மாற்ற மின்னோட்டத்தை 9.65 நிமிட நேரக்குச் செலுத்துவதன் மூலம் கரைசலிலுள்ள முழு Ag^+ அயன்களும் Ag ஆக மடிவாக்கப்பட்டனெனின் AgNO_3 கரைசலின் செறிவு (பரம மாறிலி = 96500 C mol^{-1})

- 1) 0.12 moldm^{-3} 2) 0.03 moldm^{-3} 3) 0.24 moldm^{-3}
4) 0.18 moldm^{-3} 5) 0.06 moldm^{-3}


$\text{Ag}^+ + e^- \rightarrow \text{Ag}$
 $1 \text{ mole} \rightarrow 96500 \text{ C}$
 $Q = 5 \times 60 \times 5$
 $= 1500$
 $= \frac{1500}{96500}$
 $= 0.0155$
 $= 0.03$

11. A, B, C, D ஆகியவற்றுள் நன் பெறுவதற்கு சாதகமான தாக்கங்கள் எவை?



- 1) A, B மாத்திரம் 2) B, C மாத்திரம் 3) A, B, C மாத்திரம்
4) B, C, D மாத்திரம் 5) A, B, C, D ஆகிய யாவும்

12. கீழே தரப்பட்ட சேர்வைச் சேர்வைகளைக் கருதுக.



மேலுள்ள சேர்வைகளிலிருந்து சில பலபகுதியங்கள் தொகுக்கப்டமுடியும் அப்பலபகுதியங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையற்றது.

- 1) A, B ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி னைலோனின் ஒரு வகையைத் தயாரிக்கலாம்
2) C ஐப் பயன்படுத்தி கூட்டல் பலபகுதியமொன்றைப் பெறலாம்
3) D ஐப் பயன்படுத்தி னைலோனின் ஒரு வகையைத் தயாரிக்கலாம்
4) A, B ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்திப் பெறப்படுவது ஒடுக்கல் பலபகுதிய வகையைச் சார்ந்தது
5) B, E ஐப் பயன்படுத்திப் பெறப்படும் பலபகுதியம் பொலியெஸ்டர் வகைக்குரியதாகும்

13. பூகோள வெப்பமாதலில் அதியுயர்ந்த பங்களிப்பைக் காட்டும் வாயுவை ஒரு பக்க வினைவாக உருவாக்கும் கைத்தொழில் செயன்முறை

- 1) சவர்க்கார உற்பத்தி
- 2) நைத்திரிக்கமில் உற்பத்தி
- 3) இரும்பு பிரித்தெடுப்பு
- 4) சல்பூரிக்மில் உற்பத்தி
- 5) உயிர்த்தீசல உற்பத்தி

14. CO_2 ஐக் கொண்ட வாயு மாதிரியொன்றின் அடர்த்தி $2.2 \times 10^{-2} \text{ g cm}^{-3}$ ஆகும். 4 dm^3 கனவளவைக் கொண்ட இவ்வாயு மாதிரி $Ba(OH)_2(aq)$ இனுள் செலுத்தப்பட்ட போது CO_2 முற்றாகத் தாக்கமடைந்ததுடன் $0.197 \text{ g BaCO}_3(s)$ ஐ உருவாக்கியது. வாயு மாதிரியிலுள்ள CO_2 இன் செறிவு (ppm இல்) ($Ba = 137, C = 12, O = 16$)

- 1) 100
- 2) 200
- 3) 300
- 4) 400
- 5) 500


15. ஒரு தாக்கத்தின் அரைவாழ்வுக்காலம் பற்றிய சரியான கூற்று

- 1) எப்பொழுதும் வெப்பநிலையைச் சார்ந்திருப்பதில்லை
- 2) எப்பொழுதும் வீதமாறிலியைச் சார்ந்திருப்பதில்லை
- 3) பூச்சிய வரிசைத் தாக்கத்திற்கு தாக்கியின் ஆரம்பச் செறிவில் தங்கியிருப்பதில்லை
- 4) மொத்தத் தாக்க நேரத்தின் அரைப்பங்கிற்குச் சமனாகும்
- 5) முதலாம் வரிசைத் தாக்கமொன்றில் 3 அரைவாழ்வுக் காலங்களின் பின் குறித்த தாக்கியின் செறிவு ஆரம்பச்செறிவின் $\frac{1}{8}$ மடங்காகக் குறையும்.

16. 27°C இல் ஒரு மூல மென்னமில்லங்கள் HA, HB என்பவற்றின் கூட்டப்பிரிகை மாறிலிகள் முறையே $4 \times 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}$, $1 \times 10^{-8} \text{ moldm}^{-3}$ ஆகும். 27°C இல் 0.1 moldm^{-3} HA ஐயும் 0.01 moldm^{-3} HB ஐயும் கொண்ட ஒரு கரைசலில் $[A^-] : [B^-]$ விகிதமானது (மென்னமில்லங்களின் பிரிகை மிகச்சிறிதாகக் கருதுக.)

- 1) 4000 : 1
- 2) 1 : 4000
- 3) 1 : 100
- 4) 100 : 1
- 5) 10 : 1

17. வினைத்த பாத்திரமொன்றில் 27°C இலும் $3 \times 10^4 \text{ Pa}$ அழுக்கத்திலும் $C_{(g)}$ புரத்தப்பட்டு அதனுள் கனவளவு புறக்கணிக்கத்தக்க $AB_{(s)}$ இடப்பட்டு தொகுதி 127°C இற்கு வெப்பமாக்கப்பட்டது. இதன்போது பின்வரும் சமநிலை நிலைநிறுத்தப்பட்டது



இச்சமநிலையில் தொகுதியின் மொத்த அழுக்கம் $8 \times 10^4 \text{ Pa}$ ஆகக் காணப்பட்டதெனின் மேற்படி சமநிலைக்கான சமநிலை மாறிலி (Pa^2 இல்)








- 1) 4×10^8
- 2) 6×10^8
- 3) 8×10^8
- 4) 12×10^8
- 5) 16×10^8

$$P_0 = \frac{(C)(D)}{(AB)}$$

$$3 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$4 \times 10^4 \text{ Pa}$$

18. பின்வரும் தாக்கத்தொடரைக் கருதுக



19. பல்படித்தாக்கமொன்றைப்பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானது?





- 1) குறித்த ஒரு தாக்கி சார்பான வரிசை பூச்சியமெனின் தாக்கம் நடைபெறுகையில் அத்தாக்கியின் செறிவு நேரத்துடன் மாற்றமடையாது.
- 2) குறித்த ஒரு தாக்கியின் செறிவு ஏனைய தாக்கிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் மிக அதிகமாயின் அத்தாக்கியின் செறிவில் தாக்கத்தின் வீதம் சார்ந்திருக்காது.
- 3) இருபடித்தாக்கமொன்றில் இரண்டாம் படி ஒப்பீட்டளவில் உயர் ஏவற்சக்தியைக் கொண்டதெனின் முதலில் இடைநிலையின் செறிவு நேரத்துடன் கருதக்கூடியளவிற்கு அதிகரிக்கமாட்டாது.
- 4) தாக்கத்தின் வீதவிதிகோலையில் எல்லாத் தாக்கிகளும் கட்டாயம் இடம்பெற்றிருக்கும்.
- 5) குறித்த ஒரு தாக்கி சார்பான வரிசை பூச்சியமெனின் பொதுவாக அத்தாக்கியானது வீத நிரணயப்படியை தொடர்ந்து வரும் படிக்களில் உள்ளடங்கியிருக்கலாம்.

20. மின்வாய்கள் A, B, C என்பவற்றைக் கொண்டு இரு மின்கலங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன A ஐயும் B ஐயும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட மின்கலத்தின் மின்னியக்கவிசை 1.1 V உம் B ஐயும் C ஐயும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட மின்கலத்தின் மின்னியக்கவிசை 2.72 V உம் ஆகும் இரு கலங்களிலும் B ஆனது நேர் மின்வாயாக செயற்படுகின்றது எனின் A ஐயும் C ஐயும் கொண்டு உருவாக்கப்படும் மின்கலத்தின் நியம மின்னியக்க விசை மற்றும் நேர்முனைவு ஆகியவற்றை குறிப்பது

- 1) 3.82 V, A
- 2) 1.62 V, A
- 3) 4.5 V, C
- 4) 1.62 V, C
- 5) தரவுகளைக்கொண்டு கணிக்க முடியாது

Handwritten signature and date: 10/11/2020

21. பிணைப்புக்கோணங்கள் பற்றிய பின்வரும் தொடர்புகளில் எது உண்மையானது?



22. H_2O_2 பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?

1) H_2O_2 இல் உள்ள H-O-O பிணைப்புக்கோணமானது நீரின் பிணைப்புக்கோணத்தை விட குறைவானது.

2) H_2O_2 இன் கொதிநிலை நீரின் கொதிநிலையை விட உயர்வாகும்.

3) திண்ம PbS உடன் தாக்கமடைந்து PbSO_4 ஐயும் H_2O ஐயும் உருவாக்கும்.

4) ஒட்சிசனேற்றியாகத் தொழிற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் O_2 ஐ ஒரு விளைவாகத் தரும்.

5) சூரிய ஒளி முன்னிலையில் இதன் பிரிகை இருவழிலிகாரத் தாக்கமாகும்.

23. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2$ எனும் சேர்வை பற்றிய சரியான கூற்று

1) இது NaBH_4 / methanol இனால் தாழ்த்தலடைந்து $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$ ஐ விளைவாக்கும். X

2) இது NaOH உடன் சூடாக்கும் போது NH_3 வாயுவை கொடுக்கும்.

3) எதைல் குளோரைட்டுடன் ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$) தாக்கமுற்று பிரதியிடப்பட்ட ஏமைட் ஒன்றை உருவாக்கும்.

4) இது அனிலீனை ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) காட்டிலும் ஒரு வலிமையான மூலமாகும்.

5) ஐதான HCl உடன் உப்பொன்றைத் தோற்றுவித்து நீரில் கரைகின்றது.

24. மின்பகுப்பின் விளைவுகள் எதில் தங்கியுள்ளன?

1) மின்பகுப்பொருளின் தன்மை

2) பிரயோகிக்கப்படும் மின் அழுத்தம்

3) மின்வாயின் பருமன்

4) மின்பகுப்பு நடத்தப்படும் வெப்பநிலை

5) கரைசலிலுள்ள அயன்களின் செறிவு

25. தாக்கங்களின் வெப்ப இரசாயன அம்சங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் உண்மையானது எது?




1) வாயு மூல் எண்ணிக்கையில் மாற்றமில்லாத தாக்கங்களிற்கு எந்திரப்பி மாற்றம் (ΔS) பூச்சியமாகும். X

2) ஒரு தாக்கத்தின் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் (ΔH) தாக்கம் நிகழ்த்தப்படும் நிபந்தனைகளைச் சாராதது. X

3) ஒரு மூலகத்தின் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை (ΔH_f°) அதன் பிறதிரூப வடிவங்கள் யாவற்றுக்கும் பூச்சியம். X

4) தனியாக்கப்பட்ட தொகுதியில் நடைபெறும் கயமான தாக்கங்கள் எப்பொழுதும் எந்திரப்பி அதிகரிப்புடன் நிகழும்.

5) ஒரு தாக்கத்தின் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் ஊக்கி காரணமாகத் தாக்கப்பொறிமுறை மாறும் போது மாற்றமடையும். X



27. சக்திச் சொட்டுக்கள் $n=3, l=2, m_l=+2$ மற்றும் $m_s=+1/2$ ஆகியவற்றை உடைய அணுவில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை

- 1) 9 2) 3 3) 5 4) 2 5) 1





28. சமப்படுத்தப்படாத இரசாயனச் சமன்பாடு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



X ஆக இருக்கக்கூடியது

- 1) O_2F_2 2) OF_2 3) HOF 4) F_2 5) இவற்றுள் எதுவுமன்று

29. Telfon இன் மீண்டும் மீண்டும் வரும் அலகு



30. $Cd_{(s)} / Cd_{(aq)}^{2+}$, $Zn_{(s)} / Zn_{(aq)}^{2+}$ ஆகிய மின்வாய்களைக் கொண்டுள்ள மின்னணுக்களைக்

தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது

$$E^{\circ} Cd_{(aq)}^{2+} / Cd_{(s)} = -0.40 V$$

$$E^{\circ} Zn_{(aq)}^{2+} / Zn_{(s)} = -0.76 V$$

1) Cd மின்வாய் கத்தோட ஆகும் ✓

2) செலுள்ள கலத்தின் மின்வாய் அழுத்தப் பெறுமானம் $+0.36 V$ ✓

3) மின்கற்று இணைக்கப்பட்ட போது இலத்திரான்கள் Zn மின்வாயில் திசுத்து Cd மின்வாயை நோக்கி நகர்கின்றன X

4) கூற்றுக்கள் 1, 2 மற்றும் 3 திருத்தமானவை

5) கூற்றுக்கள் 2 மற்றும் 3 மட்டும் திருத்தமானவை

31. தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (a), (b), (c), (d) எனும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை திருத்தமான தெரிவை / தெரிவுகளை தேர்ந்தெடுக்குக

1	2	3	4	5
(a) (b) (c) (d)	(a) (b) (c) (d)	(a) (b) (c) (d)	(a) (b) (c) (d)	மேலே தெரிவுகளில் எவ்விதமான திரும்புமையாகியோ திருத்தமானவை
ஆகியவை மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஆகியவை மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஆகியவை மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஆகியவை மாத்திரம் திருத்தமானவை	

31. ஊக்கி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது / எவை உண்மையானது

(a) இரசாயன தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியைக் குறைக்கும் X

(b) ஒரு ஊக்கியானது இரசாயன தாக்கமொன்றில் பங்கு பற்றி வினைவாக ஏதே ஒரு இரசாயன மாற்றத்திற்கும் தடைக்கும் உட்பட்டது ✓

(c) தாக்கத்தின் பாதையை மாற்றுவதன் மூலம் ஊக்கியானது தாக்கத்தின் வீதத்தை அதிகரிக்கின்றது ✓

(d) ஊக்கியின் அளவை அதிகரிப்பின் தாக்கத்தின் வீதம் அதிகரிக்கும்

32. Mn, Cu மற்றும் Zn ஆகிய மூன்று மூலகங்களுக்கும் பிரயோகிக்கக் கூடிய கூற்றுக்களுள் எது எவை உண்மையானது / உண்மையானவை?


(a) யாவும் தாண்டவ உலோகங்கள் X

(b) யாவும் நீருடன் நிறமுடைய சிக்கல் சேர்வைகளை உருவாக்கும்? ✓

(c) Mn ஆனது NH_3 கரைசலின் உடன் சிக்கல் சேர்வையை உருவாக்கமாட்டாது ✓


(d) செறி HCl கரைசலின் $Cu_{(aq)}^{2+}$ அயன்கள் மஞ்சள் நிற சிக்கலைத் தோற்றுவிக்கும்

33. மாறு வெப்பநிலையில் துவித காரகரைசல் A, B இரண்டைய அலத்தை வரைபடம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை




- (a) சேர்வை A யின் கொதிநிலை சேர்வை B யின் கொதிநிலையை விட உயர்வானது ✗
- (b) மேற்படி வரைபடம் இரவோல்டுடன் விதியிலிருந்து தேர்விலகலைக் காட்டுகின்றது
- (c) மேற்படி வரைபடம் இரவோல்டுடன் விதியிலிருந்து எதிரவிடகலைக் காட்டுகின்றது ✓
- (d) சேர்வை A யின் கொதிநிலை சேர்வை B யின் கொதிநிலையை விட குறைவு ✓

34. கீழே தரப்பட்ட சேர்வை P ஐப் பற்றி தரப்பட்ட கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?



- (a) அமோனியா சேர் AgNO_3 கரைசலுடன் சேர்வை P சேர்க்கப்பட்ட போது வெள்ளை வீழ்பபடிவு தோன்றும்
- (b) சேர்வை P யானது NaBH_4 / மெதனோல் உடன் சேர்க்கப்பட்டபோது வலி அறக்கோல் பெறப்படும்
- (c) சேர்வை P யானது LiAlH_4 / ether உடன் பரிசுரிக்கப்பட்ட போது ஒளியியல் செயல்திறம் தோன்றும்
- (d) சேர்வை P யானது மிகை H_2 உடன் Ni ஊக்கி முன்னிலையில் பரிசுரிக்கப்பட்ட போது ✗



எனது விளைவு தோன்றும்

35. இலட்சிய வாயுவின் மூலக்கூற்று இயக்கவியல் சமன்பாடு $PV = \frac{1}{3} n \overline{C^2}$ இனால் தரப்படுகின்றது இலட்சிய வாயு மாதிரி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது / எவை?

- (a) வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் $\overline{C^2}$ அதிகரிக்கும் ✓
- (b) மாறு வெப்பநிலையில் கனவளவு அதிகரிப்பதன் $\overline{C^2}$ அதிகரிக்கும் ✗
- (c) மாறு வெப்பநிலையில் மிகை வாயு மூலக்கூறுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட போது $\overline{C^2}$ அதிகரிக்கும் ✗
- (d) மாறு வெப்பநிலையில் அழுக்க அதிகரிப்பதன் $\overline{C^2}$ அதிகரிக்கும் ✗

36. Ca(OH)_2 இன் திரவிய கரைசலுக்கு சிறியளவு $\text{CaCl}_2(aq)$ இணை சேர்த்த போது பின்வரும் கூற்றுக்களில் இவை தொடர்பாக சரியானது எது / எவை?
- (a) சிறியளவு Ca(OH)_2 வீழ்படிவாக்கப்படும்.
- (b) OH^- இன் செறிவு அதிகரிக்கும்.
- (c) கரைசலின் pH பெறுமானம் மாற்றமடை யாது.
- (d) கரைசலின் OH^- இன் செறிவு குறைவடை யும்.

37. சமநிலை மாறிலிகள் முறையே K_1, K_2 மற்றும் K_3 உடன் தொடர்பு பின்பரும் சமநிலைகளைக் கருதுக



பின்வரும் சமன்பாடுகளில் எது மூன்று சமநிலை மாறிலிகளுக்கு இடையிலான தொடர்பைக் காட்டுகின்றது

- (a) $K_3 = K_1 + K_2$ (b) $K_3 = K_1 \times K_2$
- (c) வெப்பநிலையுடன் K_3 இன் பெறுமானம் மாற்றமடைகின்றது.
- (d) $K_3 = K_1 / K_2$
38. வலையுயரத்தின் ஒக்கோ கற்றையன் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது எது / எவை?
- (a) VO_2^+ மஞ்சள் நிறமுடையது. (b) VO^+ பச்சை நிறமுடையது.
- (c) VO^{2+} நீல நிறமுடையது. (d) VO^+ மஞ்சள் நிறமுடையது.

39. பூகோள வெப்பமாதலுக்கு பங்களிப்புச் செய்யும் வாயுக்கள் எவை?

- (a) SO_2 (b) CH_4 (c) CO_2 (d) $\text{O}_3(g)$

40. பின்வரும் கூறுகளுள் எது / எவை நீரில் கரைக்கப்படும் சொழுது அமிலக்கரைசல்களைத் தரும்

- (a) NaCl (b) CH_3COONa (c) NH_4Cl (d) NH_4ClO_4

- ❖ 41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன

தெரிவுகள்	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்கு தடுத்தமான் விளக்கத்தைத் தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்கு தடுத்தமான் விளக்கத்தைத் தருவது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41	LiI ஆனது LiF இலும் அயன இயல்பு கூடியது	இன் பருமன் F^- இன் பருமனை விட அதிகம் எனவே LiI இன் முனைவாக்கப்படும் தன்மையுடைய LiF இன் முனைவாக்கப்படும் தன்மையை விட அதிகம்



வடமாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்துடன் இணைந்து
தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலையம் நடாத்தும்
ஆறாம் தவணைப் பரீட்சை:- 2020

Conducted by Field Work Centre, Thondaimanaru.
In Collaboration with Provincial Department of Education
Northern Province

Sixth Term Examination - 2020

சொருமனவியல் - II A
Chemistry - II A

Three Hours
and ten minutes

02

T

II

Gr. 13 (2020)

அமைப்புக் கட்டுரை வினா A

* எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும் விடை தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவும் 10 புள்ளிகளைக் கொண்டுள்ளது)

01. (A) உம்மிடம் பின்வரும் சேர்வைப்பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது



(i) ஐதாள் H_2SO_4 ஆனது சேர்வையின் நீர்க்கரைசலுடன் சேர்க்கப்படும் போது மங்களான மஞ்சள் வீழ்படிவைத் தருகின்றது

(ii) அதன் நீர்க்கரைசலுடன் மிகை செறிந்த NH_3 கரைசலைச் சேர்க்கும் போது கரும் நீல நீர்க்கரைசலை தருகின்றது


(iii) கனமான நியமிப்பில் ஒரு முதல் நியமமாக பயன்படுகின்றது

(iv) பிணைப்புக் கோணம் 180° ஐக் கொண்டுள்ளது

(v) நீர்ப்பகுப்பிற்குட்பட்டு, அமிலக்கரைசலையும் மூலக்கரைசலையும் விளைவாகத் தருகின்றது.

(5 x 4 = 20 புள்ளிகள்)

(B) பின்வரும் பகுதிகள் (i) தொடக்கம் (vi) ஆகியவை $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2\text{N}$ எனும் மூலக்கூற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டவை இதன் வன்கூட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது



(i) மேற்படி மூலக்கூற்றிற்கு மிகவும் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க லூயிசின் கட்டமைப்பை வரைக.

(ii) பகுதி (i) இல் உம்மால் வழங்கப்பட்ட ஜாயியின் கட்டமைப்பைப் பரிசீலனை செய்து பரிசீலிக்கப்பட்டமைப்புகளைத் தருக. (பகுதி (i) இல் தரப்பட்ட கட்டமைப்பைத் தவிர)


(5 x 04 = 20 புள்ளிகள்)

(iii) உம்மால் வழங்கப்பட்ட பரிசீலிக்கப்பட்டமைப்புக்குரிய மிகவும் உறுதி கொண்ட கட்டமைப்பை இனம் கண்டு தருக. உமது விடையை குறுக்கமாக விளக்குக.

(03 + 03 = 06 புள்ளிகள்)

(iv) பகுதி (i) இல் வழங்கப்பட்ட ஜாயியின் கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் C, O மற்றும் N தொடர்பான

- அணுவைச்சூழ உள்ள VSEPR சோடிகள்
- அணுவைச்சூழ உள்ள இலத்தரன் சோடிகேத்திர கணிதம்
- அணுவைச்சூழ உள்ள வடிவம்
- அணுவின் கலப்பாக்கம்



		C ¹	N ⁴	O ⁵
I.	VSEPR சோடிகள்			
II.	இலத்தரன் சோடி கேத்திர கணிதம்			
III.	வடிவம்			
IV.	கலப்பாக்கம்			

(12 x 01 = 12 புள்ளிகள்)

(v) மேலே பகுதி (i) இல் தரப்பட்ட ஜாயியின் கட்டமைப்பில் பின்வரும் σ பிணைப்புகளின் உருவாக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு / கலப்பின் ஒழுக்குகளை இனம் காண்க (பகுதி iv இல் இவ் உள்ளவாறு அணுக்கள் இலக்கமிடப்பட்டுள்ளன)

$C^1 - C^2$	C^1	C^3
$C^2 - C^3$	C^2	C^3
$C^3 - O^5$	C^3	O^5
$C^3 - N^4$	C^3	N^4

(8 x 01 = 08 புள்ளிகள்)

(vi) மேலே பகுதி (i) இல் தரப்பட்ட ஜாயியின் கட்டமைப்பில் பின்வரும் π பிணைப்புகளின் உருவாக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு ஒழுக்குகளை இனம் காண்க (பகுதி iv இல் உள்ளவாறு அணுக்கள் இலக்கமிடப்பட்டுள்ளன)

$C^1 - C^2$	C^1	C^3
$C^3 - O^5$	C^3	O^5

(4 x 01 = 04 புள்ளிகள்)

(C) அடைப்புக்குறிக்குள் தரப்பட்டுள்ள இயல்புகள் அதிகரிக்கும் ஒழுங்கில் பின்வருவனவற்றை ஒழுங்குபடுத்துக (காரணங்கள் அவசியமில்லை)

(i) PCl_3 , CH_4 , SO_3 , H_2S (பிணைப்புக் கோணம்)

(ii) SO_2 , SO_3 , SO_4^{2-} , SO_3^{2-} (S இன் மின்னெதிர் இயல்பு)

(iii) Cl, O, P, S (முதலாம் இலத்திரன் ஏற்றல் சக்தி)

(iv) N, B, P, Be, Na (முதலாம் அயனாக்கல் சக்தி)

(04 x 5 = 20 புள்ளிகள்)

Q2 (A) A, B என்பன திரவ P - தொகுப்பு மூலங்களாகும். A இன் பிறதிருப்பங்களில் ஒன்று தான் தொற்று நீக்க பயன்படுத்துகின்றது. A யைக் கொண்டு மூலக்கூறு [C] ஆனது வாயுநிலையில் வளைந்த (bent) வடிவம் உடையது. C மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் காணப்படும் பிணைப்புகள் காரணமாக இது பாடுதளமையான திரவமாக காணப்படுகின்றது. C -ஆனது ஒட்சியேற்றியாகவும் தாழ்த்தியாகவும் செயற்படக்கூடியது. B ஆனது பனிங்குருவான பனிங்குரு அற்ற பிறதிருப்பங்களைக் கொண்டது. B யை வளியில் எரிக்கும் போது காரமாக மனமுடைய வாயுவை (D) உமிழ்ந்துகின்றது. D அமிலமழைக்கு பங்களிப்பு செய்யும். D ஆனது C டின் தாக்கமடைந்து இரண்டு மூல வள்ளமில் (E) யை தருகின்றது.

(i) A - E வரையானவற்றை இனம் காண்க.

A - B -
C - D -
E -

(ii) A இன் பிறதிருப்பங்கள் எவை?

.....
.....

(iii) B இன் பனிங்குருவான பிறதிருப்பங்கள் எவை? அவற்றின் கட்டமைப்புகளை வரைக.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(iv) B இன் பொதுவான ஒட்சியேற்ற எண்கள் எவை?

.....
.....

(v) C இன் ஓராயிஸ் கட்டமைப்பை வரைக.

.....
.....
.....
.....

(vi) A இன் ஐதரைட்டு அமிலமாக, மூலமாக தொழிற்படுவதைக் காட்ட சமன்பாடுகள் தருக

(vii) C ஆனது $H^+/KMnO_4$ உடன் காட்டும் தாக்க சமன்பாட்டை எயன் செய்து எழுதுக

(viii) ஊய D ஆனது B இன் ஐதரைட்டுடன் உட்கூடு தாக்க சமன்பாடு எழுது

(ix) $E_{(l)}$ யை C_2H_5OH உடன் தொழிற்பட விடும் போது நடைபெறும் தாக்கத்தை சமன்செய்து எழுதுக.

(x) E இன் பயன்பாடு இரண்டு தருக?

(xi) A அடங்கும் கூட்டத்தில் உள்ள மூலகங்களின் ஐதரைட்டுகளின் கொதிநிலை வரைபை பின்வரும் வரைபில் வரைந்து காட்டுக
கொதிநிலை K



(xii) கொதிநிலை வரைபின் போக்குக்கான காரணத்தை தருக?

கனரசலின் படடியல் (ஒழுங்குமுறையில் இல்லை)



குறிப்பு :- ஒரு கனரசல் ஒரு தடவை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும்



(II) A - F வரையான சேர்வைகளின் இரகசயன ஆத்திரங்களைத் தருக

A =

В -

C -

D +

E.


F. $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 1$

(III) மேலே b (i) குறிப்பிட்ட A, B, E, F ஆகிய வீழ்படிவுகள் கரைவதற்கான சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளைத் தருக

13 (a) (i) ஒரு மென்காரம் B இன் நீர்த்தரைசல் தரப்படுகிறது அதன் K_b இற்கான கோவையொன்றைப் பெறுக இதிலிருந்து $[OH^-]$ இற்கான ஒரு கோவையை மென்காரத்தின் செறிவு C, அயனாக மாறலி K_a என்பவற்றின் சார்பில் தருக

(ii) $25^\circ C$ இல் 0.1 mol dm^{-3} CH_3NH_2 இன் நீர்த்தரைசலொன்றின் pH பெறுமானத்தைக் கணிக்க ($K_b(CH_3NH_2) = 6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$)

(iii) தயாரிப்புக்குறியைவாயில் உள்ள 0.18 mol dm^{-3} $CH_3COONa(aq)$ இன் 25 cm^3 இற்குள் 0.18 mol dm^{-3} $HCl(aq)$ இன் 50 cm^3 படிப்படியாக சேர்க்கப்பட்ட போது ஏற்படும் pH மாற்றம் கீழேயுள்ள வரைபடத்தில் தரப்பட்டுள்ளது
 $25^\circ C$ இல் $K_a(CH_3COOH) = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$, $K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$




(f) A, B, C, D ஆகிய புள்ளிகளிற்குரிய pH பெறுமானங்களைக் கணிக்க
 புள்ளி A :-

(III) மேற்படி தராய திரவங்களின் 1 atm அழுக்கத்தினாலான கொதிநிலைகள் வருமாறு குளோரோபேரம் 61.2°C , பென்சின் 80.1°C , தொலுயின் 110.6°C , அசற்றோன் 56°C , நீர் 100°C , எத்பினால் 78°C

தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் B, E, T, C, A, W என்பவற்றில் தராய நிலை ஆவியழுக்கங்கள் முறையே $P_B^0, P_E^0, P_T^0, P_C^0, P_A^0, P_W^0$ எனக்கொண்டு இவற்றின் பெறுமானங்களை ஏறு வரிசையில் குறிப்பிடுக

(IV) ஒவ்வொரு துவிதக கரைசலிலும் குறித்த ஒரு கூறின் மூலப்பின்னம் எதிர் மொத்த ஆவியழுக்கம் மாறலைக் குறிப்பதற்கு கீழ்வரும் 3 வரைபுகள் தரப்பட்டுள்ளன. ஆறு நிலைக்குத்து அசைக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் அவற்றுக்குப் பொருந்தக்கூடியதாக $P_B^0, P_E^0, P_T^0, P_A^0, P_C^0, P_W^0$ ஆகியவற்றினை குறித்து ஒவ்வொரு வரைபையும் வரைக




(C) இரு படிக்களைக் கொண்ட ஒரு தாக்கத்தின் தாக்க ஆள்கூறு எதிர் அழுத்த சக்திக்கான வரைபட பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் வரைந்து தாக்கி, விளைவு, இடைநிலை ஏவற்படுத்திய சிக்கல்கள் ஒவ்வொரு படியினதும் ஏவற்சக்தி என்பவற்றை வரைபட குறித்துக்காட்டுக (நிகர தாக்கம் புறவெப்பத்துக்குரியது எனத் தரப்பட்டுள்ளது)

வகை I - படி (1) வீதத்தை நிர்ணயிக்கும் படி

வகை II - படி (2) வீதத்தை நிர்ணயிக்கும் படி

அழுத்த சக்தி


அழுத்த சக்தி



04 (4) A, B, C, D என்பன C_2H_4O என்ற மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தைப் பின்பற்றும் சேர்வைகள் ஆகும். இவை நான்கும் Na உடன் சேர்த்து விடும் போது H_2 வாயுவை வெளியிடுகின்றன. இவற்றில் A, B என்பன மட்டும் எதிர்வினைபுரியாத காரணம் கார்பாக்சிக் அமிலம் போன்ற சேர்வைகள் தான் $ZnCl_2$ / செறி HCl உடன் பரிசீலித்த போது A, D என்பன மீண்டும் சேர்வைகள் வெளியிடுகின்றன. கார்பாக்சிக் அமிலம் வெளியிடுகின்றன. இவற்றில் H ஆனது கார்பாக்சிக் அமிலம் தான். இவற்றில் C உடன் $NaOH$ க்கு சேர்வைகள் வெளியிடுகின்றன. A, B, D என்பன தனித்தனி PCl_5 உடன் பரிசீலிக்கப்பட்ட போது மூன்றுமே P, Q, R என்பன பெறப்பட்டன. இவற்றில் R ஆனது கார்பாக்சிக் அமிலம் தான். இவற்றில் P, Q, R என்பன சேர்வைகள் வெளியிடுகின்றன. இவற்றில் R ஆனது கார்பாக்சிக் அமிலம் தான். இவற்றில் P, Q, R என்பன சேர்வைகள் வெளியிடுகின்றன.






சேர்வை B ஐ P_2O_5 உடன் சேர்த்து விடும் போது விவரம் என்ன? சேர்வை B ஐ P_2O_5 உடன் சேர்த்து விடும் போது விவரம் என்ன?

(i) A, B, C, D, P, Q, R என்பன எந்தெந்த சேர்வைகள்? விவரம் என்ன? விவரம் என்ன?



(ii) Q, R ஆகியவற்றை சேர்த்து சேர்வைகள் வெளியிடுகின்றன. சேர்வைகள் வெளியிடுகின்றன. சேர்வைகள் வெளியிடுகின்றன.

b) பின்வரும் தாக்கங்களில் உருவாகும் பிரதான வினைபெருக்கின் கட்டமைப்பை உரிய கட்டங்களில் வரைக.



பெறும் தாக்கத்தின் வினைபெறுக கட்டமைப்பு அந்த தாக்கத்தின் பெரிதாக்கம் பற்றித் தயவுசெய்து விவரிக்கவும்.



இரசாயனவியல் - II
Chemistry - II

Gr. 13 (2020)

02

T

II

பகுதி II B - கட்டுரை வினாக்கள்

இப்பகுதியிலிருந்து எவையேனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்குக.

05. (a) இவ்வினா $\text{Na}_2\text{CO}_{3(aq)}$ இற்கும் $\text{HCl}_{(aq)}$ இற்குமிடையிலான தியமிப்புடன் தொடர்பானதாகும். நியமிப்புக் குடுவையில் $0.1 \text{ moldm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ இன் 25.00 cm^3 எடுக்கப்பட்டு அளவியிலுள்ள $0.1 \text{ moldm}^{-3} \text{HCl}_{(aq)}$ ஐச் சேர்ப்பதன் மூலம் மேலுள்ள தியமிப்பு மேற்கொள்ளப்படுவதாகக் கருதுக. (H_2CO_3 இன் முதலாம், இரண்டாம் அயனாக்க மாநிலிகள் முறையே $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7} \text{ moldm}^{-3}$, $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11} \text{ moldm}^{-3}$ எனத் தரப்பட்டுள்ளன.)
- மேற்படி நியமிப்பில் நிகழும் தாக்கங்களைக் குறிப்பிடுக.
 - இந்நியமிப்பில் இரு சந்தர்ப்பங்களில் சடுதியான pH மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இவ்விரு சமவலு நிலைகள் ஒவ்வொன்றின் போதும் சேர்க்கப்பட்ட HCl இன் கனவளவுகள் எவை?
 - K_{a1} , K_{a2} என்பவற்றுக்கான கணிதக் கோவைகளை எழுதுக.
 - அளவியிலிருந்து HCl சேர்க்க முன்னர் நியமிப்புக் குடுவையில் உள்ள $\text{Na}_2\text{CO}_{3(aq)}$ இன் pH பெறுமானத்தைக் கணிக்க.
 - முதலாம் இரண்டாம் புள்ளிக்குரிய pH பெறுமானங்களைத் தனித்தனியே கணிக்க.
 - சேர்க்கப்பட்ட HCl இன் கனவளவுடன் pH மாறும் முறையைப் பகுமட்டான வரைபில் காட்டுக.
 - மேதயில் செம்மஞ்சள், பிளோப்தலின் என்பவற்றில் முற்றான தியமிப்புக்கு பொருத்தமான காட்டி எது என்பதை கருக்கமாக விளக்குக.

- (b) A^{2+} , B^{3+} ஆகிய அயன்களைக் கொண்ட நீர்க்கரைசலொன்றில் அவ்வயன்களின் செறிவுகள் முறையே 0.10 moldm^{-3} , 0.20 moldm^{-3} ஆகக் காணப்பட்டன.

$$(K_{sp}(\text{Al}_2) = 9.0 \times 10^{-9} \text{ mol}^3 \text{dm}^{-3}, K_{sp}(\text{BI}_3) = 1.6 \times 10^{-18} \text{ mol}^4 \text{dm}^{-12})$$

- $\text{A}^{2+}_{(aq)}$, $\text{B}^{3+}_{(aq)}$ ஒவ்வொன்றையும் முறையே $\text{Al}_{2(s)}$ ஆகவும், $\text{BI}_{3(s)}$ ஆகவும் வீழ்படிவாக்குவதற்கு தேவையான $\text{I}^{-}_{(aq)}$ இன் ஆகக்குறைந்த செறிவுகளை தனித்தனியே கணிக்க.
- $\text{B}^{3+}_{(aq)}$ ஐ மட்டும் வீழ்படிவாக்க வேண்டுமாயின் பயன்படுத்த வேண்டிய $\text{I}^{-}_{(aq)}$ இன் செறிவு வீச்சைக் குறிப்பிடுக.

(C) மிகையளவு $C_{(s)}$ உம் $0.075 \text{ mol } CO_{2(g)}$ உம் மூடிய, விறைத்த 1 dm^3 கொள்கலத்தில் இடப்பட்டு 689°C வெப்பநிலையில் தொகுதி சமநிலை அடைய விடப்பட்டதும் கொள்கலத்தினுள் அழுக்கம் $8 \times 10^5 \text{ Pa}$ ஆக காணப்பட்டது. (689°C இல் $RT = 8000 \text{ Jmol}^{-1}$ எனக் கொள்க)

(i) $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$ எனும் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி K_p ஐக் கணிக்க.

(ii) இதிலிருந்து 689°C இல் K_c இன் பெறுமானத்தை துணிக.

(iii) வேறொரு பரிசோதனையில் மேற்குறிப்பிட்ட கொள்கலத்தினுள் 689°C இல் மிகை $C_{(s)}$ உடன் $CO_{(g)}, CO_{2(g)}$ என்பன புகுத்தப்பட்ட நிலையில் ஒவ்வொரு வாயுவினதும் ஆரம்ப பகுதியழுக்கங்கள் $2 \times 10^5 \text{ Pa}$ ஆக இருந்தது. $CO_{2(g)}$ இன் பகுதியழுக்க மாற்றத்தை பொருத்தமான கணிப்பின் மூலம் விளக்குக.

06. (a) (i) நேணிகவின் பரம்பல் விதியைக் குறிப்பிட்டு அவ்விதியைப் பிரயோகிப்பதற்கு தேவையான அடிப்படை நிபந்தனைகளைத் தருக.

(ii) மெதயில் பென்சீனும் நீரும் ஒன்றோடொன்று கலக்குமியல்பற்ற இரு திரவங்களாகும்.

பியூற்றைல் அமைன் இவ்விரண்டிலும் கரையக்கூடிய மென்கார இயல்புடைய பொதுக்கரையமாகும்.

அறைவெப்பநிலையில் மெதயில் பென்சீன், நீர் என்பவற்றுக்கிடையிலான பியூற்றைல் அமைனின் ($C_4H_9NH_2$) பரம்பற்குணகம் 5 எனத்தரப்பட்டுள்ளது.


$0.025 \text{ mol dm}^{-3}$ செறிவுடைய பியூட்டைல் அமைனின் காரக்கரைசலின் 35 cm^3 ஆனது 70 cm^3 மெதயில் பென்சீனுடன் குலுக்கப்பட்டுப் பெறப்பட்ட சமநிலைக் கலவையிலிருந்து மெதயில் பென்சீன் படை வேறாக்கப்பட்டது. சமநிலை நீர்ப்படையின் $\text{pH} = 10$ ஆகக் காணப்பட்டது.

சமநிலை நீர்ப்படையில் சுயாதீனமாகவுள்ள பியூற்றைல் அமைனின் செறிவைக் கணிக்க.

$$K_b(C_4H_9NH_2) = 8 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

(b) (I) பின்வரும் முதன்மைத் தாக்கத்தைக் கருதுக.



(i) தாக்கத்தின் வீத மாறிலி K எனத் தரப்படின் வீதவிதிக்கான கோவையொன்றை $NO_{(g)}, O_{3(g)}$ ஆகியவற்றின் செறிவுகள் சார்பாக எழுதுக.

(II) இத்தாக்கத்தின் தாக்க ஆள்கூற்று வரைபை பருமட்டாக வரைந்து அதில் பின்வருவனவற்றை உரிய நிலைகளில் தெளிவாக குறிப்பிடுக.

(i) தாக்கிகள், விளைவுகளின் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரம் ✓

(ii) ஏவற்படுத்தப்பட்ட சிக்கலின் கட்டமைப்பு


(iii) ஏவற்சக்தி (நிலைக்குத்து அம்புக்குறி மூலம்) மற்றும் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் (ΔH)

(C) $2NO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2NOCl_{(g)}$ எனும் தாக்கத்தின் இயக்கவாண்மியலை ஆராய்வதற்கு $-10^{\circ}C$ இல் செய்யப்பட்ட நான்கு பரிசோதனைகளின் பெறுபெறுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன

பரிசோதனை இலக்கம்	$NO_{(g)}$ இன் ஆரம்பச் செறிவு / moldm^{-3}	$Cl_{2(g)}$ இன் ஆரம்பச் செறிவு / moldm^{-3}	$Cl_{2(g)}$ மறையும் ஆரம்பத்தாக்க விதம் / $\text{moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$
1	0.15 ✓	0.15 ✓	0.60
2	0.15 ✓	0.30	1.20
3	0.30	0.15 ✓	2.40
4	0.10	?	0.36

- மேற்குறித்த தாக்கத்தின் வீதத்துக்கான சமன்பாட்டை $NO_{(g)}, Cl_{2(g)}$ ஆகியவற்றின் செறிவுகள் சார்பாக எழுதுக.
- $NO_{(g)}, Cl_{2(g)}$ ஆகிய ஒவ்வொரு தாக்கி சார்பாகவும் தாக்கவரிசைகளைக் கணிக்க.
- மொத்த தாக்க வரிசை யாது?
- $NO_{(g)}, Cl_{2(g)}$ ஆகியன தொடர்பான வரிசை, வீதமாறி k என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி வீத விதிக்கான கோவையை எழுதுக.
- வீதமாறிலியின் பெறுமானத்தைக் கணிக்க.
- பரிசோதனை 4 இல் பயன்படுத்தப்பட்ட $Cl_{2(g)}$ இன் செறிவைக் கணிக்க.
- $NO_{(g)}, Cl_{2(g)}$ ஒவ்வொன்றினதும் ஆரம்பச் செறிவுகள் 0.1 moldm^{-3} ஆக இருக்கும் போது $-10^{\circ}C$ இல் $NO_{(g)}$ மறையும் தொடக்கத் தாக்கவீதத்தைக் கணிக்க.
- மேற்குறித்த தாக்கத்திற்கு பின்வரும் இரு முதன்மைப் படிகளைக் கொண்ட பொறிமுறையொன்று பிரேரிக்கப்படுகின்றது.
படி I: $NO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons NOCl_{2(g)}$ (ஒரு விரைவான சமநிலை படி சமநிலை மாறிலி k_c)
படி II: $NOCl_{2(g)} + NO_{(g)} \rightarrow 2NOCl_{(g)}$ (ஒரு மெதுவான படி தாக்கவீதமாறிலி k')
மேலுள்ள பொறிமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பகுதி (iv) இல் பெற்ற வீத விதிக்கோவையை பெறுக.

07. (a) (I) வன் மின்பகுபொருள், மென்மின்பகுபொருள் எனும் பதங்களை வரையறை செய்து அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் இவ்விரண்டு உதாரணங்கள் தருக. அரிதாக கரையும் அயன் திண்மங்கள் மேலுள்ளவற்றின் எவ்வகைக்குரியன என சுருக்கமாக விளக்குக.
- (II) கீழ்த்தரப்பட்டுள்ளது கடத்தியொன்றின் வரிப்படமாகும்.



R - தடை


A - குறுக்குவெட்டுப்பரப்பளவு

l - கடத்தியின் நீளம்

- (i) மேற்படி கடத்தியின் தடைத்திறன் ρ இற்குரிய கோவையொன்றை R, l, A இன் சார்பில் பெறுக.

- (ii) மேற்படி கடத்தியின் கடத்துறன் K எனின் K, ρ இற்கிடையிலான தொடர்பைத் தருக.
- (iii) மேலுள்ள தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி K இற்கான சமன்பாட்டைத் தருக.
- (iv) திரவமொன்றின் கடத்துதிறனைப் பாதிக்கும் 3 காரணிகளை குறிப்பிடுக.


(II) பின்வரும் வினா Zn மின்வாயையும் மற்றும் உலோகம் - கரையா உப்பு வகையைச் சார்ந்த வேறொரு மின்வாயையும் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட மின்னிராசயனக் கலத்துடன் தொடர்பானது



- (i) திரவம் A, பதார்த்தங்கள் B, C இல் அடங்குபவற்றை இனங்காண்க.
- (ii) மேலுள்ள இரு மின்வாய்களையும் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்படும் மின்கலத்தின் நியம மின்னியக்கவிசையைத் துணிவதற்கான பரிசோதனை ஒழுங்கமைப்பின் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படத்தை வரைக.
- (iii) இக்கலத்திலிருந்து மின்னோட்டமொன்றைப் பெற்றுக்கொள்ளும் போது
 - I. அனோட்டில் நிகழும் தாக்கம்.
 - II. கதோட்டில் நிகழும் தாக்கம்.
 - III. கலத்தின் நிகர தாக்கம் என்பவற்றை எழுதுக.
- மின்வாய் 1 இன் நியம தாழ்த்தல் அழுத்தம் = -0.76 V
- மின்வாய் 2 இன் நியம தாழ்த்தல் அழுத்தம் = 0.22 V
- (iv) கலத்துக்கான IUPAC குறியீட்டைத் தருக.
- (v) மேற்படி கலத்தின் மின்னியக்க விசையை அதிகரிப்பதற்கு 3 வழிகளைக் குறிப்பிடுக.

(b) A, B ஆகியன மூலக்கூற்றுச் சூத்திரம் $\text{CoN}_5\text{H}_{12}\text{I}_2\text{O}_2$ ஐயுடைய இரு இணைப்புச் சேர்வைகளாகும். இவற்றின் இணைப்புக்கோளங்கள் எண்முகிக் கேத்திரகணிதத்தையுடையன. இவற்றில் H அணுக்கள் NH_3 ஆக மாத்திரம் இருக்கின்றன. இரு சேர்வைகளிலும் கோபால்ற்று ஒரே ஓட்சியேற்ற நிலையில் உள்ளது. சேர்வை B மட்டும் $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ உடன் ஐதான அல்லது செறிந்த NH_3 இல் கரையும் இயல்பற்ற மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைத் தருகின்றது.

- I. மேற்குறித்த சேர்வைகளில் Co இன் ஓட்சியேற்ற நிலை யாது?
- II. இச் சேர்வைகளில் காணப்படும் Co அயனின் இலத்திரன் நிலையமைப்பை எழுதுக.
- III. காரணங்கள் தந்து A, B ஆகிய சேர்வைகளின் கட்டமைப்புச் சூத்திரங்களை உய்த்தறி.
- IV. சேர்வை A இல் உள்ள அன்னயனை இனங்காண்பதற்கான ஒரு சோதனையை குறிப்பிடுக.
- V. glycinate இன் கட்டமைப்பு வருமாறு




A, B இலுள்ள Co இன் கற்றயனுடன் இது இணைந்து எண்முகிக் கேத்திரகணிதமுடைய சிக்கலயன் X ஐ உருவாக்குமாயின் X இன் கட்டமைப்பை வரைக.

பகுதி C

இப்பகுதியிலிருந்து எவையேனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடை எழுதுக.


08. (a) ஒரே சேதன ஆரம்பிக்கும் பொருளாக CC(=O)Nc1ccccc1 ஐயும் பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ளவற்றை மாத்திரம் சோதனைப் பொருள்களாகவும் பயன்படுத்தி, எட்டு (8) இற்கு மேற்படாத படிமுறைகளில் பின்வரும் சேர்வையை எங்கனம் தொகுப்பீர்.



சோதனைப் பொருட்கள்

PBr₃, PCC, LiAlH₄, NaOH, H⁺/H₂O, Br₂(aq)

(b) பின்வரும் தாக்கதிட்டத்தை பூரணப்படுத்துவதற்காக R₁ - R₇ யும் X₁ - X₆ யும் இனங்காண்க.



(c) (i) பின்வரும் தாக்கத்திற்கான பொறிமுறையை தருக.



(ii) காரணங்களைத் தருவதன் மூலம் அமின் (RNH₂), அற்ககோல் (ROH) என்னும் சேர்வைகளில் எது மூலத்தன்மை கூடியது எனக் குறிப்பிடுக.

09. (a) P என்னும் ஒரு நீர்க்கரைசலில் நான்கு உலோக கற்றயங்கள் அடங்கியுள்ளன. இக்கற்றயங்களை இனங்காண்பதற்கு பின்வரும் சோதனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

சோதனை	அவதானிப்பு
(1) P இன் சிறிய பகுதியை ஐதான சூடான HCl சேர்க்கப்பட்டது	வெண்ணிற வீழ்படிவு (P_1) $AgCl$
(2) P_1 வடிகட்டி வேறாக்கப்பட்டது வடிதிரவத்தின் ஊதாக H_2S வாயு செலுத்தப்பட்டது.	கருமை நிற வீழ்படிவு (P_2) $Fe^{3+}, Bi^{3+}, Pb^{2+}$
(3) P_2 வடிகட்டி வேறாக்கப்பட்டது H_2S ஐ நீக்குவதற்காக கொதிக்கவைக்கப்பட்டு குளிரவிடப்பட்டு NH_4OH / NH_4Cl சேர்க்கப்பட்டது.	வீழ்படிவு இல்லை Fe, Cr, Al
(4) மேலே (3) இல் கிடைக்கும் கரைசலினூடாக H_2S வாயு செலுத்தப்பட்டது.	கருமைநிறவீழ்படிவு (P_3) Co^{2+}, Ni^{2+}
(5) P_3 வடிகட்டி வேறாக்கப்பட்டது H_2S ஐ நீக்குவதற்காக வடிதிரவம் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு குளிரவிடப்பட்டு $(NH_4)_2CO_3$ சேர்க்கப்பட்டது.	வெள்ளை வீழ்படிவு (P_4) $BaCO_3, SrCO_3, CaCO_3$

P_1, P_2, P_3, P_4 ஆகிய வீழ்படிவுகளுக்குப் பின்வரும் சோதனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

வீழ்படிவு	சோதனை	அவதானிப்பு
P_1 $AgCl$	I. P_1 இன் ஒரு பகுதிக்கு நீர் சேர்க்கப்பட்டு கலவை கொதிக்கவிடப்பட்டது. II. P_1 இன் வேறொரு பகுதிக்கு ஐதான NH_4OH சேர்க்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் KBr கரைசல் சேர்க்கப்பட்டது.	P_1 கரையவில்லை P_1 கரைந்தது மென்மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு
P_2 PbS	சூடான ஐதான HNO_3 இல் P_2 கரைக்கப்பட்டு KI கரைசல் சேர்க்கப்பட்டது. வீழ்படிவு P_5 நீர்சேர்க்கப்பட்டு கலவை கொதிக்கவிடப்பட்டது.	கடும் மஞ்சள் வீழ்படிவு (P_5) PbI_2 கரைந்து தெளிந்த கரைசலைக் கொடுத்தது.
P_3 NiS	I. சூடான செறிந்த HNO_3 இல் P_3 கரைக்கப்பட்டது. II. மேற்படி கரைசல் I இற்கு பின்வருவன சேர்க்கப்பட்டன. செறிந்த HCl மட்டான ஐதான NH_4OH மிகையான ஐதான NH_4OH	பச்சை நிறக்கரைசல் (கரைசல் 1) Ni^{2+} மஞ்சள் நிறக்கரைசல் (கரைசல் 2) பச்சை வீழ்படிவு (P_6) $Ni(OH)_2$ நீலக்கரைசல் (கரைசல் 3)
P_4 $BaCO_3$	P_4 ஆனது செறிந்த HCl இல் கரைக்கப்பட்டு கவாலைச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.	மஞ்சள் - பச்சை கவாலை

- (i) கரைசல் P இல் உள்ள நான்கு உலோக கற்றயன்களையும் இனங்காண்க? (காரணங்கள் அவசியமல்ல).
- (ii) $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ ஆகிய வீழ்படிவுகளையும் 1, 2, 3 ஆகிய கரைசல்களின் நிறங்களுக்கு காரணமான இரசாயன இனங்களையும் இனங்காண்க.
- (iii) P_1 ஆனது NH_4OH இல் கரைவதற்கும் P_5 கொதிக்க வைக்கையில் கரைவதற்குமான சமன்பாடு தருக?
- (b) ஒரு சுத்தவ பொருளும் FeO, Fe_2O_3 என்பவற்றைக் கொண்டுள்ள மாதிரியில் FeO, Fe_2O_3 இன் சதவீத அமைப்பைத் துணிய பின்வரும் செயன்முறைகள் பின்பற்றப்பட்டது.
- செயன்முறை I - தாதிற் உள்ள எல்லா இரும்பையும் Fe^{2+} ஆக மாற்றுவதற்கு தாதின் 16.0 g மாதிரி மிகையான நீர் KI ($50cm^3$) உடன் அமில் ஊடகத்தில் தொழிற்படவிடப்பட்டது. பின்னர் கரைசல் $250cm^3$ வரைக்கும் ஐதாக்கப்பட்டது. ஐதாக்கிய கரைசலின் $25cm^3$ பகுதியை $1\text{ moldm}^{-3} Na_2S_2O_3$ கரைசலுடன் நியமித்த போது முடிவுப்புள்ளி $5cm^3$ ஆக காணப்பட்டது.
- செயன்முறை II - தாதின் பிறிதொரு 16.0 g மாதிரி மிகையான ஐதான அமில்த்தில் கரைத்து கரைசலாக்கப்பட்டது. நீர் சேர்ந்து $250cm^3$ கரைசலாக்கப்பட்டது. கரைசலின் $25cm^3$ பகுதியானது 0.1 moldm^{-3} செறிவுடைய $KMnO_4$ கரைசலினால் நியமிக்கப்பட்டது. $KMnO_4$ கரைசலின் 20 cm^3 நியமிப்பிற்கு தேவைப்பட்டது.
- (i) செயன்முறை I, II இல் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளை தருக?
- (ii) FeO, Fe_2O_3 இன் திணிவு சதவீதங்களைக் கணிக்க?
(Fe - 56, O - 16)

10. (a) (i) நீரின் வன்மை என்பதால் நீர் என்ன விளங்கிக் கொள்கின்றீர்.
- (ii) நீரின் வன்மைக்கு காரணமான உலோகக்கற்றயன்களை பட்டியலிடுக.
- (iii) மேலே நீர் பட்டியலிட்ட கற்றயன்களில் இயற்கையான வன்மைக்கு பங்களிப்பு செய்யும் அயன்களைத் தருக?
- (iv) நீரின் வன்மையின் இருவகைகளையும் கூறுக?
- (v) மேற்கூறிய நீரின் வன்மைகளை நீக்குவதற்கான ஒவ்வொரு வழிகளைக் கூறி அவற்றிற்கான தகுந்த இரசாயனச் சமன்பாட்டையும் தருக?
- (vi) மேலே நீர் கூறிய நீரின் வன்மைக்கு காரணமான கற்றயன்களில் நீரின் இரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வியை (Chemical oxygen Demand) அதிகரிக்கும் கற்றயன்களைப் பெயரிடுக?
- (vii) நீரின் இரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வியை அறிய பயன்படுத்தப்படும் ஒட்சியேற்றி எது?

- (i) கரைசல் P இல் உள்ள நான்கு உலோக கற்றயன்களையும் இனங்காண்க? (காரணங்கள் அவசியமல்ல).
- (ii) $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ ஆகிய வீழ்படிவுகளையும் 1, 2, 3 ஆகிய கரைசல்களின் நிறங்களுக்கு காரணமான இரசாயன இனங்களையும் இனங்காண்க.
- (iii) P_1 ஆனது NH_4OH இல் கரைவதற்கும் P_5 கொதிக்க வைக்கையில் கரைவதற்குமான சமன்பாடு தருக?

(b) ஒரு சுத்தவ பொருளும் FeO, Fe_2O_3 என்பவற்றைக் கொண்டுள்ள மாதிரியில் FeO, Fe_2O_3 இன் சதவீத அமைப்பைத் துணிய பின்வரும் செயன்முறைகள் பின்பற்றப்பட்டது.


செயன்முறை I - தாதில் உள்ள எல்லா இரும்பையும் Fe^{2+} ஆக மாற்றுவதற்கு தாதின் 16.0 g மாதிரி மிகையான நீர் KI ($50cm^3$) உடன் அமில ஊடகத்தில் தொழிற்படவிடப்பட்டது. பின்னர் கரைசல் $250cm^3$ வரைக்கும் ஐதாக்கப்பட்டது. ஐதாக்கிய கரைசலின் $25cm^3$ பகுதியை $1\text{ moldm}^{-3} Na_2S_2O_3$ கரைசலுடன் நியமித்த போது முடிவுப்புள்ளி $5cm^3$ ஆக காணப்பட்டது.

செயன்முறை II - தாதின் பிறிதொரு 16.0 g மாதிரி மிகையான ஐதான அமிலத்தில் கரைத்து கரைசலாக்கப்பட்டது. நீர் சேர்ந்து $250cm^3$ கரைசலாக்கப்பட்டது. கரைசலின் $25cm^3$ பகுதியானது 0.1 moldm^{-3} செறிவுடைய $KMnO_4$ கரைசலினால் நியமிக்கப்பட்டது. $KMnO_4$ கரைசலின் 20 cm^3 நியமிப்பிற்கு தேவைப்பட்டது.

- (i) செயன்முறை I, II இல் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளை தருக?
- (ii) FeO, Fe_2O_3 இன் திணிவு சதவீதங்களைக் கணிக்க?
- (Fe - 56, O - 16)

10. (a) (i) நீரின் வன்மை என்பதால் நீர் என்ன விளங்கிக் கொள்கின்றீர்.
- (ii) நீரின் வன்மைக்கு காரணமான உலோகக்கற்றயன்களை பட்டியலிடுக.
- (iii) மேலே நீர் பட்டியலிட்ட கற்றயன்களில் இயற்கையான வன்மைக்கு பங்களிப்பு செய்யும் அயன்களைத் தருக?
- (iv) நீரின் வன்மையின் இருவகைகளையும் கூறுக?
- (v) மேற்கூறிய நீரின் வன்மைகளை நீக்குவதற்கான ஒவ்வொரு வழிகளைக் கூறி அவற்றிற்கான தகுந்த இரசாயனச் சமன்பாட்டையும் தருக?
- (vi) மேலே நீர் கூறிய நீரின் வன்மைக்கு காரணமான கற்றயன்களில் நீரின் இரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வியை (Chemical oxygen Demand) அதிகரிக்கும் கற்றயன்களைப் பெயரிடுக?
- (vii) நீரின் இரசாயன ஒட்சிசன் கேள்வியை அறிய பயன்படுத்தப்படும் ஒட்சியேற்றி எது?

(b)



குளோரைட்டுச் செயன்முறையைப் பயன்படுத்தி TiO_2 உற்பத்தி செய்தலை மேற்குறித்த பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் காட்டுகின்றது.

- ஆரம்பப் பொருள் A ஐ இனங்காண்க?
- X, Y, Z, Q ஆகியவற்றிற்காக பயன்படுத்தப்படும் செயன்முறைகளை கீழேயுள்ள பட்டியலில் இருந்து இனங்காண்க.
மீள்கழற்சி, வெப்பமேற்றல், உலர்த்துதல், குளிர்த்துதல்.
- B, F, G இல் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயன பதார்த்தங்களை இனங்காண்க?
- C, D, E ஆகிய இரசாயனப்பொருட்களை இனங்காண்க.
- C, D, E ஆகியன உருவாவதற்கான சமன்செய்த சமன்பாடு எழுதுக.
- பக்க விளைவு H ஐ இனங்காண்க.
- L, M ஆகிய மாசுக்களை இனங்காண்க.
- A, E என்பவற்றிற்கிடையிலான பிரதான வேறுபாடு என்ன?
- A அடங்கியுள்ள கனியங்கள் இரண்டைப் பெயரிடுக?

(c) ஓசோன் படை சிதைவடைதலை குறைப்பதற்குக் குளோரோபுளோரோக் காபன்களுக்கு (CFC கள்) பதிலாக ஐதரோ குளோரோபுளோரோக் காபன்கள் (HCFC கள்) அறிமுகஞ்செய்யப்பட்டன. எனினும் இவை குறைந்தளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதுடன் வேறு சுற்றாடற் பிரச்சினைகளுக்கு பங்களிப்பு செய்கின்றன. தற்போது ஐதரோபுளோரோ காபன்கள் (HFC கள்) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றினால் ஓசோன்படைக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லை எனினும் இவையும் வேறு சுற்றாடற் பிரச்சினைகளுக்குப் பங்களிப்பு செய்கின்றன.

- இம் மூன்று வாயுக்களும் பொதுவாக எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
- ஒரு தனி C அணுவின் கூடிய எல்லா CFC, HCFC, HFC களினதும் இரசாயனக் கட்டமைப்பை வரைக. அவை ஒவ்வொன்றையும் CFC / HCFC / HFC எனப் பெயரிடுக.
- CFC, HCFC, HFC ஆகியவற்றுடன் தொடர்புபட்ட வேறொரு சுற்றாடற் பிரச்சினையைக் குறிப்பிடுக.
- மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றாடற் பிரச்சினை காரணமாக இம்மூன்று வாயுக்களும் பொதுவாக எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
- (c) iii இல் நீர் குறிப்பிட்ட சுற்றாடற் பிரச்சினைகளிற்கு CFC, HCFC, HFC சார்பங்களிப்புப்பற்றி விமர்சிக்க?



இலங்கையின் உயர்தர கணித விஞ்ஞான
பிரிவின்கான இணையதளம்

SCIENCE EAGLE

www.scienceeagle.com

- ✓ Biology
- ✓ C.Maths
- ✓ Physics
- ✓ Chemistry
- + more

 t.me/ScienceEagle
 [YouTube/ScienceEagle](https://www.youtube.com/ScienceEagle)
   [/ScienceEagleSL](https://www.instagram.com/ScienceEagleSL)

