



இலங்கையின் உயர்தர கணித விஞ்ஞான
பிரிவின்கான இணையதளம்

SCIENCE EAGLE

www.scienceeagle.com

- ✓ Biology
- ✓ C.Maths
- ✓ Physics
- ✓ Chemistry
- + more

 t.me/ScienceEagle
 [YouTube/ScienceEagle](https://www.youtube.com/ScienceEagle)
   [/ScienceEagleSL](https://www.instagram.com/ScienceEagleSL)





யாழ். வலயக் கல்வித் திணைக்களத்தின் அனுசரணையுடன்
தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலையம் நடாத்தும்

Field Work Centre

தவணைப் பரீட்சை, மார்ச் - 2016

Term Examination, March - 2016

தரம் :- 12 (2017)

இணைந்த கணிதம்

நேரம் :- 3.00 மணித்தியாலங்கள்

அறிவுறுத்தல்கள்:

- பகுதி யு இன் எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடைகளைத் தரப்பட்ட இடத்தில் எழுதுக. மேலதிக இடம் தேவைப்படுமெனின், நீர் மேலதிகத் தாள்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
- பகுதி டி இல் உள்ள 7 வினாக்களில் விரும்பிய 5 வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
- ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் முடிவடைந்ததும் பகுதி யு ஆனது பகுதி டி யிற்கு மேலே இருக்கக் கூடியதாக இரு பகுதிகளையும் இணைத்துப் பரீட்சை மண்டப மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி டி யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படும்.

இணைந்த கணிதம்		
பகுதி	வினா எண்	கிடைத்த புள்ளிகள்
யு	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
டி	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
மொத்தம்		

இணைந்தகணிதம் I

இணைந்தகணிதம் II

மொத்தப்புள்ளிகள்

இறுதிப்புள்ளிகள்

பகுதி - டி

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} 2 & ; x < -1 \text{ எனின்} \\ x+1 & ; -1 \leq x < 1 \text{ எனின்} \\ -2 & ; x \geq 1 \text{ எனின்} \end{cases}$$

$f(x)$ எனும் சார்பின் வரைபை வரைந்து ஆட்சி, வீச்சு என்பவற்றைக் காண்க.

(2) x இன் எல்லா மெய்ய் பெறுமானங்களுக்கும் $mx^2 - 4x + 3m + 1 > 0$ ஆகும். வகையில் m இன் தீர்வுத் தொடையைக் காண்க.

(3) சமனிலி $\frac{x}{2x-1} \geq 1$ ஐத் திருத்திப்படுத்தும் x இன் மெய்ப் பெறுமானங்களின் தொடையைக் காண்க.

க்குக.

- {1} இற்கு $\log_a a^2 b^3 = \frac{7}{3}$ எனின், $\log_b a^3 b^2$ இன் பெறுமானம்

[illegible]

[illegible]

பெரிய செய்தி

.....

.....

.....

- (9) P, Q என்பன நிகர்த்த சமாந்தர விசைகள் ஆகும். P ஆனது a தூரத்தினூடாக இடப்பெயர்ச்சி அடைந்தால் P, Q என்பவற்றின் விளையுள் $\frac{Pa}{P+Q}$ தூரத்தினூடாக இடப்பெயர்ச்சி அடையும் எனக் காட்டுக.

- (10) நிலைத்த புள்ளி O இற்கு இணைக்கப்பட்ட OA என்ற நீளா இழையின் மறு நுனி A இல் 10 N நிறை கட்டப்பட்டுள்ளது. OA ஆனது நிலைக்குத்துடன் 30° கோணத்தை அமைக்குமாறு A இற்கு 5 N இழுவிசை பிரயோகிக்கப்படுகிறது. தொகுதி சமநிலையில் இருப்பின் இவ்விசையின் திசையைக் காண்க.



யாழ். வலயக் கல்வித் திணைக்களத்தின் அனுசரணையுடன்
தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலையம் நடாத்தும்

Field Work Centre

தவணைப் பரீட்சை, மார்ச் - 2016

Term Examination. March - 2016

தரம் :- 12 (2017)

இணைந்த கணிதம்

நேரம் :- 3.00 மணித்தியாலங்கள்

பகுதி - B

(11) (a) $x^2 - px + q = 0$ இன் மூலங்கள் α, β ஆகும்.

i) $\alpha^2 + \beta^2$

ii) $\alpha^3 + \beta^3$

iii) $\alpha^5 + \beta^5$

என்பவற்றை p, q இன் சார்பில் காண்க.

(b) $x^2 + cx + ab = 0$, $x^2 + bx + ca = 0$ எனும் இரு இருபடிச் சமன்பாடுகள் பொது மூலம் ஒன்றைக் கொண்டுள்ளதெனின், $a + b + c = 0$ எனக் காட்டுக.

அத்துடன், அவற்றின் மற்றைய மூலங்கள் $x^2 + ax + bc = 0$ என்பதன் மூலங்களாகும் எனக் காட்டுக.

(c) $f(x) \equiv x^4 - 6x^3 + 14x^2 - 14x + 5$ எனக் கொள்வோம்.

மீதித் தேற்றத்தை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தி $(x - 1)^2$ ஆனது $f(x)$ இன் ஒரு காரணியெனக் காட்டுக.

$f(x)$ ஐ வடிவம் $(x - a)^2 (x^2 + bx + c)$ இல் எடுத்துரைக்க; இங்கு a, b, c என்பன துணியப்பட வேண்டிய மாறிலிகளாகும்.

x இன் மெய்ப் பெறுமானங்களுக்கும் $f(x) \geq 0$ என உய்த்தறிக.

(12) (a) பின்வருவனவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க.

(i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{3x^2 + 2}$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x + 5} - 3}{x - 2}$

(iii) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{A}} \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\cos x - \sin x}$

(iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + 3 \sin 2x}{4 \sin x + 5 \sin 3x}$

(b) (i) $x = 2 (\cos \theta + \theta \sin \theta)$, $y = 2 (\sin \theta - \theta \cos \theta)$ எனின் $\theta = \frac{\pi}{4}$ இல் $\frac{dy}{dx}$ ஐக் காண்க.

(ii) $y = x \tan y$ எனின், $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x - x^2 - y^2}$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து $(x - x^2 - y^2) \frac{d^2y}{dx^2} = 2 \frac{dy}{dx} (x + y \frac{dy}{dx})$ எனக் காட்டுக.

(13) (a) $\cot \theta - \tan \theta = 2 \cot 2\theta$ எனக்காட்டி,

$\tan \theta + 2 \tan 2\theta + 4 \tan 4\theta = \cot \theta - 8 \cot 8\theta$ என்பதை உய்த்தறிக.

(b) $\cot \alpha \cot \beta = k$ எனின்

$(k + 1) \cos (\alpha + \beta) = (k - 1) \cos (\alpha - \beta)$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து $\cot \theta \cot \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{1}{3}$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

(c) $\tan^{-1} \left(\frac{a}{x} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{b}{x} \right) = \frac{\pi}{2}$ எனின் $x^2 = ab$

(d) $\sin^{-1} x, \sin^{-1} 2x$ என்பன நேர்க் கூர்ங்கோணங்களாக இருக்க

$\sin^{-1} x + 2 \sin^{-1} 2x = \frac{\pi}{2}$ எனின்,

$x = \frac{\sqrt{33}-1}{16}$ எனக் காட்டுக.

(14) (a) ஒரு முக்கோணிக்கு வழமையான குறியீட்டுடன் சைன் விதியையும் கோசைன் விதியையும் கூறுக.

ஒரு முக்கோணி ABC இல் $\hat{B} = 3\hat{C}$ எனின்,

$\cos C = \sqrt{\frac{b+c}{4c}}$ எனவும் $\sin \frac{A}{2} = \frac{b-c}{2c}$ எனவும் காட்டுக.

(b) முக்கோணி ABC இல் பக்கங்கள் AB, BC, CA இன் நீளங்கள் முறையே $7 \text{ cm}, 2 \text{ cm}, b \text{ cm}$ ஆகும். $\angle ACB = 30^\circ$ எனின்,

$b^2 - 2\sqrt{3}b - 45 = 0$ எனக் காட்டி, b ஐக் காண்க.

$\sin B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ எனக் காட்டுக.

(c) $A + B + C = \pi$ எனின்,

$\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2 + 2 \cos A \cos B \cos C$ எனக் காட்டுக.

(15) (a) ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியில் இருந்து சுயாதீனமாக விழவிடப்படும் ஒரு துணிக்கை x தூரம் செல்லும் கணத்தில் கோபுரத்தின் உச்சியில் இருந்து y தூரம் கீழே உள்ள ஒரு புள்ளியில் இருந்து இன்னொரு துணிக்கை சுயாதீனமாக விழவிடப்படுகின்றது. இரு துணிக்கைகளும் ஒரே நேரத்தில் தரையை அடையும் எனின்,

(i) இரு துணிக்கைகளுக்குமான வேக – நேர வரைபுகளை ஒரே படத்தில் வரைக.

(ii) வேகநேர வரைபை மாத்திரம் பயன்படுத்தி

(α) முதலாவது துணிக்கை x தூரத்தை அடைய எடுக்கும் நேரம் $\sqrt{\frac{2x}{g}}$ எனக் காட்டுக.

(β) முதலாவது துணிக்கை x தூரத்தை அடையும்போது வேகம் $\sqrt{2gx}$ எனக் காட்டுக.

(γ) இரண்டாவது துணிக்கை தரையை அடைய எடுக்கும் நேரம் $\frac{y-x}{\sqrt{2gx}}$ எனக் காட்டுக.

(δ) கோபுரத்தின் உயரம் $\frac{(x+y)^2}{4x}$ எனக் காட்டுக.

(b) இரண்டு பையன்கள் கிடைத் தரையின் மீது a இடைத்தூரத்தில் நிற்கின்றனர். ஒருவன் $2h$ உயரத்தில் இருந்து u எனும் வேகத்துடன் ஒரு பந்தை எறிகின்றான். மற்றையவன் அதனை h உயரத்தில் பிடிக்கின்றான். முதலாவது பையன் பந்தைக் கிடையுடன் எறிந்த சாய்வு θ எனின்,

$$ga^2 \tan^2 \theta - 2u^2 a \tan \theta + ga^2 - 2u^2 h = 0 \text{ எனக்காட்டுக.}$$

தரைக்கு மேல் பந்தால் அடையப்பட்ட அதியுயர் உயரத்தைக் காண்க.

(16) A, B என்ற புள்ளிகளின் தானக்காவிகள் முறையே a, b ஆகும். AB என்ற நேர்கோட்டில் உள்ள புள்ளி C இன் தானக்காவி c எனின்,

(i) $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$ எனக் காட்டுக.

(ii) $a + b, c$ என்பன செங்குத்தானவை எனின்,

$$\lambda = \frac{a \cdot b - b^2}{b^2 - a^2} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

(iii) OAB இல் M, L என்பன முறையே AB, OM இன் நடுப்புள்ளிகள் AL, OB ஐ N இல் சந்திக்கிறது. $ON = \lambda OB, LN = \mu AL$ ஆக இருப்பின், $\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b$ எனக்கொண்டு,

(α) $\overrightarrow{ON}, \overrightarrow{LN}, \overrightarrow{OL}$ என்பவற்றை a, b சார்பாகக் காண்க.

(β) $\frac{ON}{NB}$ ஐக் காண்க.

(17) i) $P - Q, P, P + Q$ ஆகிய விசைகள் ஒழுங்காக எடுக்கப்பட்ட சமபக்க முக்கோணியின் பக்கங்களுக்குச் சமாந்தரமாக தாக்குகின்றன. விளையுளின் பருமனைக் காண்க.

ii) $18\frac{1}{2}m$ நீளமும் $300 kg$ திணிவும் உடைய AB என்ற கோல் C, D என்ற புள்ளிகளிலுள்ள முனைகளில் கிடையாகத் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளது.

$$AC = 6m, \quad AD = 13\frac{1}{2}m, \quad AG = 10m$$

இங்கு புவியீர்ப்பு மையம் G இல் உள்ளது.

(α) ஒவ்வொரு முனையிலும் உள்ள தாக்கத்தைக் காண்க.

(β) A இலிருந்து B இற்கு நடக்கும்போது கோலைச் சரிக்காது நடக்கக்கூடிய மனிதனின் மிகக்கூடிய நிறையைக் காண்க.



இலங்கையின் உயர்தர கணித விஞ்ஞான
பிரிவின்கான இணையதளம்

SCIENCE EAGLE

www.scienceeagle.com

- ✓ Biology
- ✓ C.Maths
- ✓ Physics
- ✓ Chemistry
- + more

 t.me/ScienceEagle
 [YouTube/ScienceEagle](https://www.youtube.com/ScienceEagle)
   [/ScienceEagleSL](https://www.instagram.com/ScienceEagleSL)

